



J. (Hans) de Keijzer, Coördinator Effectief Middelenpakket Akkerbouw

De informatie in dit overzicht is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks een uitvoerige controle kunnen wij geen enkele garantie geven over de juistheid, de volledigheid of het bijgewerkt zijn van de informatie. Lees voordat u een middel toepast altijd de informatie op het begeleidende etiket.

Dit overzicht is een momentopname; er vinden regelmatig wijzigingen plaats. Voor de laatste stand van zaken moet u opnieuw een verzoek indienen.

Herbiciden	Middelen	Plaag	Tijdstip	Dosering, frequentie, interval en vht
Chloridazon	Pyramin DF, Better DF	(Eenjarige) breedbladige onkruiden	Voor en na opkomst; Better alleen na opk.	Voor opkomst 2-3 kg/ha; 1x; na opkomst 0,5-0,95 kg/ha; 4x; 5d; max. 3,0 kg/ha per teeltcyclus in 1 op 3 jaar chloridazon op zelfde perceel; Better 5x; 7d; vht Pyramin 60d
Clethodim	Centurion Plus, Wopro-Clethodim 120 g/l	Eenjarige grasachtige onkruiden en stuifdek, kweek	Na opkomst	1 l/ha; 1x; vht 56d; tegen kweek 2,5 l/ha
Clomazone	Centium 360 CS, Wopro Clomazone 360 CS	Eenjarige breedbladige onkruiden	Voor en na opkomst	Voor opk. 0,2 l/ha; 1x; na opk. 0,05-0,1 l/ha; 4x; 7d of 0,2 l/ha; 1x; max. 0,2 l/ha
Clopyralid	Lontrel 100, Lontrel SG, Cliophar 100 SL, Vivendi 100, Lontrel 600, Cliophar 600 SL	Breedbladige onkruiden	Na opkomst	1,2 l/ha; 1x; kleine eenjarige 0,5 l/ha; 3x; 7d; max. 1,5 l/ha; Lontrel SG 0,165 kg/ha; 1x; kleine eenj. 0,07 kg/ha; 3x; max. 0,2 kg/ha; tussen 1/9 en 1/3 niet in grondwaterbeschermingsgebieden; Lontrel 600 0,2 l/ha; 1x en/of 0,08 l/ha ; 3x; 7d; max. 0,25 l/ha; Cliophar 600 SL 0,2 l/ha en/of 0,08 l/ha; 2x; 7d; max. 0,2 l/ha; Lontrel 600 en Cliophar 600 SL geen beperking voor grondwaterbeschermingsgebieden
Cycloxydim	Focus Plus	Grasachtige onkruiden	Tussen of over het gewas	2 l/ha; 2x; 10d of 4-5 l/ha; 1x; max. 5 l/ha; vht 56d
Desmedifam+Ethofumesaat+Fenmedifam	Betasana Trio SE, Betanal Elite, Belvedere Triple	Eenjarige breedbladige onkruiden	Na opkomst	Betasana 2-2,5 l/ha; 3x; 5d of 1-1,4 l/ha; 7x; 5d; max. 7 l/ha; Betanal Elite 1-1,5 l/ha; 4x; 6d; max. 4,5 l/ha; Belvedere 1,3 l/ha; 3x; 5d

Desmedifam+Ethofumesaat+Fenmedifam+Lenacil	Betanal maxxPro	Eenjarige breedbladige onkruiden	Na opkomst	0,9-1,5 l/ha; 5x; 5d; max. 4,5 l/ha
Desmedifam+Fenmedifam	Betanal Power	Eenjarige onkruiden	Na opkomst	0,6-1 l/ha; 5x; 7d of 1 l/ha; 3x; 7d; max. 3 l/ha
Dimethenamide-P	Frontier Optima	Eenjarige onkruiden	Na opkomst	0,3 l/ha; 3x; 7d of 0,45 l/ha; 2x; 7d of 0,9 l/ha; 1x
Ethofumesaat	Oblix 200 EC, Oblix 500 SC, Trammat 200, Trammat 500	Eenjarige grasachtige en breedbladige onkruiden	Na opkomst	Zie etiketten
Ethofumesaat+Fenmedifam	Magic Tandum, Powertwin	Eenjarige breedbladige onkruiden	Na opkomst	Powertwin 0,5-1 l/ha; 6x; 7d; max. 5 l/ha; Magic Tandum 1-1,5 l/ha (zie etiket); 3x; 5d; max. 4,0 l/ha; vht 90d
Ethofumesaat+Metamitron	Goltix Super	Eenjarige breedbladige onkruiden, straatgras	Voor en na opkomst	Voor opkomst 2 l/ha; 1x; na opk. 2 l/ha; 3x; 7d of 1 l/ha; 6x; 7d; max. 6 l/ha
Fenmedifam	Astrix EC, Corzal, Kontakt 320 SC, Corzal SE	Eenjarige breedbladige onkruiden	Na opkomst	0,5-1 l/ha; 8x; 7d; 6 l/ha; 1x; 3 l/ha; 2x; 10d; max. 6 l/ha; Kontakt 3 l/ha; 1x; 1,5 l/ha; 2x; 4d; 1,5-3 l/ha; 1x; 0,25-0,5 l/ha; 6x; 7d; max. 3 l/ha; Corzal SE 0,5-0,75 l/ha; 8x; 7d; 1-1,5 l/ha; 8x; 7d; 2-2,5 l/ha; 4x; 7d; max. 8 l/ha; of rijenbeh. met 50% van doseringen 8x; 7d
Fluazifop-P-butyl	Fusilade Max	Grasachtige onkruiden	Na opkomst	1-3 l/ha; 1x; vht 56d; niet tussen 30/9 en ¼
Haloxifop-P-methyl	Gallant 2000	Eenjarige grasachtige onkruiden	Na opkomst na BBCH19	1 l/ha; 1x; vht 90d; niet in grondwaterbeschermingsgebieden
Metamitron	Aako Goltix 70 WG, Aako Goltix 700 SC, Goltix SC, Goltix WG, Bettix SC, Budget Metamitron SC	Eenjarige onkruiden	Voor, rond en na opkomst	Zie etiketten
Metamitron+Quinmerac	Goltix Queen	Eenjarige breedbladige onkruiden	Voor en na opkomst	1x per 2 jaar na opkomst 2 l/ha; 3x; 7d of voor opkomst 3 l/ha; 1x en na opkomst 1 l/ha; 3x; 5d; min. 10 d tussen voor opkomst en 1 ^e na opkomst; niet in grondwaterbeschermingsgebieden tussen 1-9 en 1-3
Propaquizafop	Agil 100 EC, Flash 100 EC, Zetrola	Eenjarige grasachtige onkruiden, graanopslag, hanepoot, duist, raaigras, wilde haver, kweek	Na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden, graanopslag 0,75-1 l/ha; 1x; hanepoot, duist 0,2 l/ha; 2x; 14d of 0,75-1 l/ha; 1x; raaigras 1-1,2 l/ha; 1x; wilde haver 0,4 l/ha; 2x; 14d of 1-1,2 l/ha; 1x; kweek 0,75 l/ha; 2x;

				14d of 1,5 l/ha; 1x; max. 1,5 l/ha; vht 60d
Quizalofop-P-ethyl	Pilot, Targa Prestige	Hanepoot,duist, windhalm, wilde haver, graanopslag, raaigrassen, kweek	Na opkomst	Hanepoot 1 l/ha; 1x of 0,5 l/ha; 2x; duist, windhalm, wilde haver, graanopslag 1-1,5 l/ha; 1x of 0,5 l/ha; 2x; raaigrassen 1,5 l/ha; 1x of 1 l/ha; 2x; kweek 2 l/ha; 1x; max. 2 l/ha
S-metolachloor	Dual Gold 960 EC, Efica 960 EC	Eenjarige breedbladige onkruiden	Na opkomst	0,25-1 l/ha; 4x; 7d; max. 1,5 l/ha; niet in grondwaterbeschermingsgebieden; niet op zandgrond
Triflusulfuron-methyl	Safari	Breedbladige onkruiden	Na opkomst	30 g/ha; 4x; 7d
Diquat-dibromide	Mission, Dragoon, Reglone Bold, Diquanet, Roquat	Eenjarige breedbladige onkruiden	Voor opkomst	1,5-2 l/ha; 1x
Glyfosaat	Veel middelen	Onkruiden	Voor opkomst; pleksgewijs en/of aanstrijken	Zie etiketten
Insecticiden	Middelen	Plaa	Tijdstip	Dosering, frequentie, interval en vht
Deltamethrin	Decis, Imex-Deltamethrin EC 25, Wopro Deltamethrin	Vroege akkertrips (Thrips angusticeps), rupsen van de Gamma uil (Autographa gamma)	Gewasbehandeling	0,3 l/ha; 1x; vht 30d
Esfenvaleraat	Sumicidin Super, Sumi-Alpha 2.5 EC	Larven van de aardappelstengelboorder (Hydraecia micacea), trips	Gewasbehandeling	Rupsen 0,45 l/ha; 2x; 7d; trips 0,2 l/ha; 2x; 7d; vht 7d
Flonicamid	Teppeki	Zwarte bonenluis (Aphis fabae), Groene perzikluis (Myzus persicae)	Gewasbehandeling	0,14 kg/ha; 1x; vht 60d
Lambda-cyhalothrin	Karate Zeon Ninja	Trips (Thrips angusticeps)	Gewasbehandeling	0,05 l/ha; 1x; vht 7d
Metam	Monam Nemasol	Aaltjes	Grondontsmetting; 16 maart t/m 15 november	300 l/ha; 1x per 5 jaar; zie etiket voor beperkingen
Oxamyl	Vydate 10G Wopro Oxamyl 10% G	Cystenaaltjes, wortelknobbelaaltjes, vrijlevende aaltjes, kevers, springstaarten, stengelaaltjes, emelten	Rijenbehandeling tijdens zaaien	Cystenaaltjes 25 kg/ha; wortelknobbelaaltjes, stengelaaltjes, emelten 15 kg/ha; vrijlevende aaltjes 10 kg/ha; kevers, springstaarten 7,5 kg/ha
Pirimicarb	Pirimor UPL Pirimicarb	Groene perzikluis, zwarte bonenluis	Gewasbehandeling	0,4 kg/ha; 2x; 14d; vht 7d
Tefluthrin	Force	Bietenkever (Atomaria linearis)	Zaadbehandeling	60 ml per 100.000 zaden

Thiacloprid	Calypso Dadian	Bladluis (groene en roze perzikluis [<i>Myzus persicae</i>], zwarte bonenluis [<i>Aphis fabae</i>], sjalotteluis [<i>Myzus ascalonicus</i>])	Gewasbehandeling	0,25 l/ha; 2x; 21d; vht 35d
Fungiciden	Middelen	Plaag	Tijdstip	Dosering, frequentie, interval, vht e.d.
Cyproconazool+Trifloxystrobin	Sphere	Bladvlekkenziekte (<i>Cercospora beticola</i> en <i>Ramularia betae</i>), roest (<i>Uromyces beticola</i>) en echte meeldauw (<i>Erysiphe betae</i>).	Gewasbehandeling zodra aantasting wordt waargenomen	0,35 l/ha; 2x; 21d; vht 21d
Difenoconazool	Score 250 EC, Borgi, Mavita 250 EC	Bladvlekkenziekte (<i>Cercospora beticola</i>), <i>Ramularia beticola</i>	Gewasbehandeling	0,4 l/ha; 2x; 21d; vht 28d; niet in grondwaterbeschermingsgebieden
Difenoconazool+Fenpropidin	Spyrale	Bladvlekkenziekte (<i>Cercospora beticola</i>), meeldauw (<i>Erysiphe betae</i>), <i>Ramularia beticola</i> en roest (<i>Uromyces betae</i>).	Gewasbehandeling	1 l/ha; 2x; 21d; vht 28d; niet in grondwaterbeschermingsgebieden
Difenoconazool+Propiconazool	Difure Pro	Roest (<i>Uromyces betae</i>)	Gewasbehandeling	0,6 l/ha; 2x; 14d; vht 21d; niet in grondwaterbeschermingsgebieden tussen 1/9 en 1/3
Epoxiconazool+Fenpropimorf	Opus Team	Bladvlekkenziekte (<i>Cercospora beticola</i>) Bladvlekkenziekte (<i>Ramularia beticola</i>) Roest (<i>Uromyces betae</i>) Echte meeldauw (<i>Erysiphe betae</i>)	Gewasbehandeling	1 l/ha; 2x; 21d; vht 46d; niet in grondwaterbeschermingsgebieden
Epoxiconazool+Pyraclostrobin	Retengo Plust	Bladvlekkenziekte (<i>Cercospora beticola</i> , <i>Ramularia beticola</i>), roest (<i>Uromyces beticola</i>), meeldauw (<i>Erysiphe betae</i>)	Gewasbehandeling	0,5-1 l/ha; 1x; vht 28d
Fludioxonil+Metalaxyl-M+sedaxaan	Vibrance SB	<i>Pythium ultimum</i> , bladvlekkenziekte (<i>Pleospora betae</i> , <i>Phoma betae</i>), <i>Rhizoctonia</i> (<i>Thanatephorus</i>)	Zaadbehandeling	33,3 ml per 100.000 zaden

		cucumeris, Rhizoctonia solani)		
Hymexazool	Tachigaren 70 WP	Kiemplantenziekten (Aphanomyces spp., Pythium spp.)	Zaadbehandeling	40 g per eenheid zaad (100.000 zaden)
Diversen	Middelen	Plaag	Tijdstip	Dosering, frequentie, interval, vht e.d.
Ijzer(III)fosfaat	Derrex, NEU 1181M, Sluux HP, Natria Slakkenkorrels, Iroxx, CropGuard Slakkenkorrel, Ironmax Pro, Ferramol Ecostyle Slakkenkorrels	Naaktslakken	Strooien	7 kg/ha; 4x; 7d (Ironmax Pro 5d) Natria en Ferramol 25-50 kg/ha; 4x; 14d