

Deze brochure geeft de gemiddelde resultaten weer van het cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek (CGO) van suikerbieten van 2019-2022. Deze zijn gebruikt voor het vaststellen van de Aanbevelende Rassenlijst 2023 door de Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst (CSAR). Het onderzoek is gecoördineerd door het IRS en gefinancierd door kweekbedrijven, Cosun Beet Company en telers. De gegevens over de rassen in de Aanbevelende Rassenlijst (pagina's 3, 4 en 5) zijn verkregen uit onderzoek dat gedurende minimaal drie jaar is verricht op meerdere proefvelden, verdeeld over de teeltgebieden in het land. Dit is een solide basis voor een verantwoorde rassenkeuze.

In deze brochure worden ook de resultaten gegeven van de rassen die (nog) niet op de rassenlijst staan en waarvoor slechts twee jaar CGO-onderzoek plaatsvond. De eigenschappen van de rassen staan in de tabellen 1 tot en met 3. De cijfers uit de verschillende tabellen zijn niet onderling vergelijkbaar, omdat ze verkregen zijn op verschillende proefvelden. Overname van de gegevens is toegestaan, mits bronvermelding plaatsvindt.

## Rassenkeuze: 1. Benodigde resistentie

- Voor percelen waar een risico op rhizoctonia-aantasting bestaat: kies een rhizoctoniaresistent ras (tabel 1). Wanneer er tevens bietencystealtjes voorkomen, overweeg dan een rhizoctoniaresistent ras met tevens bietencystealtjesresistentie.
- Op percelen waar bietencystealtjes voorkomen: kies een bietencystealtjesresistent ras (tabel 2). Deze rassen zijn al rendabel bij een aantoonbare besmetting met witte of gele bietencystealtjes. In de kolom financiële opbrengst is van elk bietencystealtjesresistent ras te zien wat het verschil is met een vatbaar rhizomanieras. Er is geen rekening gehouden met de hogere zaadkosten voor deze rassen. De cijfers in tabel 2 kunnen niet vergeleken worden met die in tabel 3.
- Heeft u geen rhizoctonia en geen bietencystealtjes, kies dan een rhizomanieresistent ras (tabel 3). Om zeker te zijn dat u geen bietencystealtjes heeft, is het wel verstandig om eerst een grondmonster te laten analyseren.
- Op diverse percelen door heel Nederland komt een resistentie doorbrekende variant van het rhizomanievirus voor. Deze percelen zijn herkenbaar aan een zeer groot aantal planten met rhizomaniesymptomen (zogenaamde blinkers; zie [www.irs.nl/blinker](http://www.irs.nl/blinker)). Indien blinkers in plekken of stroken voorkwamen, of als meer dan 2-5% van de bieten verspreid over het perceel uit blinkers bestond, dan is het advies om te kiezen voor een ras met zogenaamde aanvullende rhizomanieresistentie. Deze zijn beschikbaar in alle categorieën (resistentieniveau aangegeven in de tabellen). Kies bij percelen met een hoge kans op doorbraak van de standaard rhizomanieresistentie voor een ras met zeer goede of goede aanvullende rhizomanieresistentie.
- Wanneer in deze brochure wordt gesproken over resistentie, wordt partiële resistentie bedoeld. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat bij ernstige rhizoctoniabesmetting bij de rhizoctoniaresistente rassen rotte bieten kunnen voorkomen en dat bij gebruik van bietencystealtjesresistente rassen er nog wel vermeerdering van bietencystealtjes kan optreden.
- Voor percelen waar onkruidbieten of bepaalde probleemkruiden verwacht worden is de inzet van een Conviso Smart ras te overwegen. Conviso Smart rassen hebben een resistentie tegen het herbicide Conviso One. In elk resistentiesegment is een dergelijk ras opgenomen (zie tabel 1, 2 en 3). Conviso Smart rassen zijn beperkt beschikbaar en alleen in overleg met Cosun te bestellen. De Conviso Smart rassen zijn onderzocht op proefvelden waarbij de onkruidbestrijding met de gangbare middelen is uitgevoerd. Informeer u vooraf over de extra eisen aan de teelt, hygiënemaatregelen en resistentie management bij keuze voor een Conviso Smart ras, zie ook [www.irs.nl/conviso](http://www.irs.nl/conviso).

## Rassenkeuze: 2. Financiële opbrengst en raseigenschappen

Kijk binnen het juiste resistentiesegment vervolgens zowel naar financiële opbrengst als naar overige raseigenschappen, zoals bladgezondheid cercospora, suikergehalte, kophoogte en vroegheid grondbedekking. Deze eigenschappen kunnen voor specifieke situaties ook bepalend zijn voor de uiteindelijk gerealiseerde opbrengst. De berekening van de financiële opbrengst van de rassen is gebaseerd op de uitbetalingsregeling van Cosun Beet Company en op het vol leveren van de toewijzing.

In de navolgende tabellen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd voor de berekening van de financiële opbrengst:

- biet: € 45,00 per ton nettobiet bij 17% suiker. Onder nettobiet wordt verstaan de gewassen biet inclusief de kop, maar zonder groen;
- gehalte: de suikergehalteverrekening is vergelijkbaar met die van Cosun Beet Company. Bij 17% suiker vindt geen verrekening plaats. Bij lagere suikergehalten wordt een korting toegepast (bijvoorbeeld bij 16% suiker € 4,05 per ton nettobiet, terwijl bij hogere gehalten een toeslag wordt gegeven (bijvoorbeeld bij 18% suiker € 4,05 per ton nettobiet));
- WIN: de WIN-verrekening is vergelijkbaar met die van Cosun Beet Company. Bij WIN 91 vindt geen verrekening plaats;
- tarra: € 12,70 per ton tarra.

Voor de berekening van de WIN en de financiële opbrengst zijn gegevens ontleend aan de bietleveranties aan Cosun Beet Company.

Dit zijn:

wortelopbrengst (t/ha)	85,0	suikergehalte (%)	17,0	meegeleverde grond (%)	10,0
aminoN (mmol/kg biet)	10,0	K+Na (mmol/kg biet)	40,0		

## Zaadsoorten en geboden bescherming

Alle zaadsoorten zijn behandeld met Tachigaren. Dit middel bevat het fungicide hymexazool als actieve stof en is uiterst effectief tegen aphanomyces en pythium. Aphanomyces kan op alle grondsoorten voorkomen en zorgen voor plantwegval in de eerste weken na opkomst. Vandaar dat standaard al het suikerbietenpillenzaad met Tachigaren behandeld is. Meer informatie is ook te vinden op [www.irs.nl/fungicidenpillenzaad](http://www.irs.nl/fungicidenpillenzaad).

Voor beheersing van insectenschade is voor 2023 wederom pillenzaad met Force (actieve stof tefluthrin) te bestellen. Force heeft een contactwerking en werkt daarom alleen tegen bodeminsecten, zoals bietenkevers, ondergrondse springstaarten, wortelduizendpoten en (in mindere mate) ritnaalden. Indien er dieper dan 2-2,5 cm gezaaid wordt kan het vooral bij koudere omstandigheden lang duren voordat de kiemplantjes boven komen en kan de werking van Force alsnog onvoldoende zijn. Het middel Force werkt niet tegen blad insecten. Telers wordt daarom geadviseerd om na te gaan of pillenzaad met Force voor hun situatie nodig is. Meer informatie is te vinden op [www.irs.nl/teelthandleidingforce](http://www.irs.nl/teelthandleidingforce).

## Schietergevoeligheid

De huidige aanbevolen rassen hebben in het algemeen een goede schieterresistentie. Echter, onder ongunstige omstandigheden kunnen alle rassen schieten: uitzaaï voor 10 maart, langdurig lage temperatuur en stressomstandigheden tijdens en na opkomst verhogen bij alle rassen het risico op schietervorming. Ook lichtintensiteit (kustgebieden) en devernalisatie is hierop van invloed (zie ook [www.irs.nl/schieters](http://www.irs.nl/schieters)).

## Risico op aphanomyces

In 2021 kwam op diverse percelen op zand- en dalgrond, met name na overvloedige neerslag en als de pH lager dan 6,0 was, veel aantasting door aphanomyces voor. Het ras Caprianna KWS bleek daarbij gevoelig te zijn voor aphanomyces. Om het risico te beperken is het advies om het ras Caprianna KWS niet te zaaien op zand- en dalgrond.

## Benodigde hoeveelheid zaad en restzaad

Per hectare is ongeveer 1,05 eenheid zaad nodig ([www.irs.nl/zaadhoeveelheid](http://www.irs.nl/zaadhoeveelheid)). Bestel niet meer dan u met zekerheid kunt uitzaaïen, resterend zaad kan niet retour geleverd worden.

Restzaad kunt u bewaren tot het volgende seizoen, mits gebruik gemaakt van een door het IRS aanbevolen bewaarmethode ([www.irs.nl/bietenzaad](http://www.irs.nl/bietenzaad)). Gebruik zaad van het vorige seizoen alleen wanneer dit op de aanbevolen wijze is bewaard. De kiemenergie en de werking van de toegevoegde middelen kan anders na bewaring onvoldoende zijn.

## Verantwoording en aansprakelijkheid

Deze brochure is samengesteld door het IRS in opdracht van Cosun Beet Company. IRS en Cosun Beet Company zijn niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan bij het gebruikmaken van de in deze brochure vermelde gegevens.

**KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.IRS.NL**

De verhoudingsgetallen op deze pagina zijn niet vergelijkbaar met de verhoudingsgetallen op pagina's 4 en 5.

Tabel 1. Overzicht van eigenschappen bij **rhizoctoniaresistente** suikerbietenrassen (bepaald op proefvelden met een risico op rhizoctoniabesmetting)<sup>1)</sup>

rubriek	rasnaam	waardering				verhoudingsgetallen (gemiddelden 2019-2022) <sup>3)</sup>							rhizoctonia-resistentie <sup>8)</sup>	aanvullende rhizomanie-resistentie <sup>9)</sup>	opbrengst met bca-besmetting <sup>10)</sup>
		vroegheid grond-bedekking	kop-hoogte <sup>4)</sup>	meege-leverde grond <sup>5)</sup>	blad-gezondheid cercospora <sup>6)</sup>	K+Na	aminoN	suiker-gehalte	WIN	wortel-opbrengst	suiker-opbrengst	financiële opbrengst <sup>7)</sup>			
A <sup>2)</sup>	Annemarta KWS	8	M	M	8	99	105	101	100	100	101	102	zeer goed	matig	
A	BTS 4190 RHC	7,5	M	M	6,5	100	117	104	100	94	98	100	goed		
A	Springfield	8	M	M	6,5	93	86	97	100	104	101	100	goed		
N	Reforma KWS	7	M	M	9	96	85	98	100	104	102	102	matig		
N	Lincoln	8	M	M	8,5	92	77	99	100	102	101	101	matig		
B	BTS 7105 RHC	6,5	M	M	6,5	108	93	98	100	101	100	98	goed		
B	Smart Liesa KWS <sup>11)</sup>	6,5	M	M	8	91	86	100	101	90	90	91	goed	goed	
<b>Ras op de Aanbevelende Rassenlijst met tevens resistentie tegen bietencysteaaltjes</b>															
A	Edonia KWS	8,5	M	M	7,5	102	94	99	100	104	103	102	matig	goed	matig
<b>Twee jaar onderzocht, nog niet op de Aanbevelende Rassenlijst, beperkt verkrijgbaar</b>															
1K125 (Fadela KWS)		7,5	L	M	8	101	94	99	100	104	103	102	goed	matig	matig
Gemiddelde vatbare rassen						103	80	99	100	105	105	105			

Hoge cijfers betekenen in het algemeen een gunstige waardering van de betrokken eigenschap, behalve voor K+Na, aminoN.

- 1) De cijfers in deze tabel zijn niet vergelijkbaar met de cijfers in tabel 3 op pagina 5. De genoemde rassen zijn onderzocht op proefvelden waar een risico is op rhizoctoniabesmetting. De resistentie tegen rhizoctonia is partieel, dat wil zeggen dat bij ernstige rhizoctoniabesmetting ook bij deze rassen wortelrot kan optreden.
- 2) Rubricering in de Rassenlijst: A = algemeen aanbevolen ras; N = nieuw aanbevolen ras; B = beperkt aanbevolen ras.
- 3) De verhoudingsgetallen (100 =) zijn gebaseerd op het gemiddelde van de rhizoctoniaresistente A- en N-rassen van rassenlijst 2022.
- 4) Kophoogte: L = laag, M = gemiddeld en H = hoog boven de grond.
- 5) Meegeleverde grond: L = weinig, M = gemiddeld en H = veel.
- 6) Bladgezondheid cercospora: 4 = laag t/m 9 = hoog.
- 7) Voor de berekening van de financiële opbrengst zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: wortelopbrengst 85 ton/ha; suikergehalte 17%; aminoN 10 mmol/kg biet; K+Na 40 mmol/kg biet en meegeleverde grond 10%.
- 8) Rhizoctonia klasseindeling: ≤ 2,7 = zeer goed; 2,8 - 3,0 = goed; ≥ 3,1 = matig.
- 9) Aanvullende resistentie tegen de AYPR- of een andere nieuwe variant van het rhizomanievirus.
- 10) De opbrengst van deze rassen op percelen met bietencysteaaltjesbesmetting blijft achter ten opzichte van de bietencysteaaltjesresistente rassen op de Aanbevelende Rassenlijst. Zie tabel 2 voor nadere informatie.
- 11) Tevens Conviso One resistentie.

Bron: persbericht CSAR, Aanbevelende Rassenlijst 2023, 29 november 2022.  
Het onderzoek is uitgevoerd door het IRS te Dinteloord.

De verhoudingsgetallen op deze pagina zijn niet vergelijkbaar met de verhoudingsgetallen op pagina's 3 en 5.

Tabel 2. Overzicht van eigenschappen van suikerbietenrassen met **resistentie tegen bietencysteaaltjes** (bepaald op proefvelden met bietencysteaaltjes)

rubriek	rasnaam	waardering				verhoudingsgetallen (2019-2022) <sup>2)</sup>							aanvullende rhizomanie-resistentie <sup>7)</sup>
		vroegheid grond-bedekking	kop-hoogte <sup>3)</sup>	meege-leverde grond <sup>4)</sup>	blad-gezondheid cercospora <sup>5)</sup>	K+Na	aminoN	suiker-gehalte	WIN	wortel-opbrengst	suiker-opbrengst	financiële opbrengst <sup>6)</sup>	
A <sup>1)</sup>	Tessilia KWS	7,5	M	M	7	102	94	102	100	99	101	102	
A	BTS 1115 N	7	M	M	7	101	97	101	100	99	100	100	
B	Leontina KWS	7,5	M	H	7,5	98	87	99	100	101	100	99	goed
B	Caprianna KWS	8	M	M	7	98	108	97	100	102	99	98	goed
B	BTS Smart 1645 N <sup>8)</sup>	7,5	L	H	8	101	117	102	100	91	92	91	matig
B	Smart Imma KWS <sup>8)</sup>	6,5	L	M	6,5	99	114	102	100	89	91	91	matig
B	Smart Latoria KWS <sup>8)</sup>	6,5	M	M	7,5	108	101	97	99	95	93	90	
B	Redukto <sup>9)</sup>	8,5	L	H	7	99	97	96	100	90	86	82	
<b>Twee jaar onderzocht, nog niet op de Aanbevelende Rassenlijst, beperkt verkrijgbaar</b>													
	1K140 (Jemina KWS) <sup>9)</sup>	8	M	H	8,5	88	87	98	100	90	88	85	matig
	Gemiddelde van de vatbare rhizomanie rassen			M		101	76	99	100	90	88	88	
	Ras met rhizoctoniaresistentie, vatbaar voor bietencysteaaltjes	8,5	M	M	8	95	103	104	101	84	87	90	matig
<b>Rassen met rhizoctonia- en bietencysteaaltjesresistentie</b>													
B	Edonia KWS	8,5	M	M	7,5	109	101	98	99	93	91	89	goed
<b>Twee jaar onderzocht, nog niet op de Aanbevelende Rassenlijst, beperkt verkrijgbaar</b>													
	1K125 (Fadela KWS)	7,5	L	H	8	106	96	99	100	94	94	92	matig

Hoge cijfers betekenen in het algemeen een gunstige waardering, behalve bij K+Na en aminoN.

<sup>1)</sup> Rubricering in de rassenlijst: A = algemeen aanbevolen ras; N = nieuw aanbevolen ras; B = beperkt aanbevolen ras.

<sup>2)</sup> De verhoudingsgetallen (100 =) zijn gebaseerd op het gemiddelde van de A- en N-rassen uit de rassenlijst 2022.

<sup>3)</sup> Kophoogte: L = laag, M = gemiddeld en H = hoog boven de grond.

<sup>4)</sup> Meegeleverde grond: L = weinig, M = gemiddeld en H = veel.

<sup>5)</sup> Bladgezondheid cercospora: 4 = laag t/m 9 = hoog.

<sup>6)</sup> Voor de berekening van de financiële opbrengst zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: wortelopbrengst 85 ton/ha; suikergehalte 17%; aminoN 10 mmol/kg biet; K+Na 40 mmol/kg biet en meegeleverde grond 10%.

<sup>7)</sup> Aanvullende resistentie tegen AYPR- of een andere nieuwe variant van het rhizomanievirus.

<sup>8)</sup> Tevens Conviso One resistentie.

<sup>9)</sup> Tevens resistentie tegen *Meloidogyne chitwoodi*.

Bron: persbericht CSAR, Aanbevelende Rassenlijst 2023, 29 november 2022.

Het onderzoek is uitgevoerd door het IRS te Dinteloord.

De verhoudingsgetallen op deze pagina zijn niet vergelijkbaar met de verhoudingsgetallen op pagina's 3 en 4.

Tabel 3. Overzicht van eigenschappen suikerbietenrassen voor de teelt op percelen zonder rhizoctonia en zonder bietencysteaaltjes (bepaald op proefvelden zonder rhizoctonia en zonder bietencysteaaltjes)

rubriek	rasnaam	waardering				verhoudingsgetallen (gemiddelden 2019-2022) <sup>2)</sup>							aanvullende rhizomanie-resistentie <sup>7)</sup>
		vroegheid grond-bedekking	kop-hoogte <sup>3)</sup>	meegeleverde grond <sup>4)</sup>	blad-gezondheid cercospora <sup>5)</sup>	K+Na	aminoN	suiker-gehalte	WIN	wortel-opbrengst	suiker-opbrengst	financiële opbrengst <sup>6)</sup>	
A <sup>1)</sup>	Leontina KWS <sup>bcaR</sup>	7,5	M	M	7,5	99	99	99	100	105	103	102	goed
A	Jewel	7,5	H	L	6,5	96	99	102	100	97	99	101	
A	Queena KWS	7,5	M	L	6,5	109	91	101	100	99	100	101	
A	Mertha KWS	7	L	M	6,5	89	108	104	101	93	97	100	matig
A	Yukon	7,5	H	L	7	97	97	101	100	98	99	100	matig
A	Tessilia KWS <sup>bcaR</sup>	7,5	M	H	7	102	100	100	100	101	101	100	
A	Caprianna KWS <sup>bcaR</sup>	8	M	M	7	96	112	96	100	105	102	100	goed
N	Koema	7,5	M	L	6	98	106	100	100	100	101	102	
N	Sherlock	7,5	M	M	7,5	107	99	101	100	100	101	101	
N	Banda	9	M	L	7,5	99	97	100	100	99	99	100	
N	BTS 2090	8	M	M	7,5	101	99	103	100	94	97	99	
B	BTS 2335	7	M	H	7	111	107	98	99	103	101	99	
B	BTS 6740	7	M	M	7,5	102	88	97	100	104	101	99	goed
B	Xandor	7	M	M	8	103	116	100	100	97	97	98	matig
B	Laser	9	L	M	7,5	98	92	98	100	101	98	98	
B	BTS Smart 1645 N <sup>bcaR 8)</sup>	7,5	L	M	8	103	135	100	99	93	93	93	matig
B	Smart Latoria KWS <sup>bcaR 8)</sup>	6,5	M	M	7,5	105	103	97	100	94	92	90	
B	Redukto <sup>bcaR 9)</sup>	8,5	L	M	7	102	116	95	99	96	91	87	
<b>Twee jaar onderzocht, nog niet op de Aanbevelende Rassenlijst, beperkt verkrijgbaar</b>													
	MH4054 (Cockpit)	8,5	L	L	7	93	103	100	100	96	96	98	
	B1258 (BTS 2620)	9	M	M	9	106	104	96	99	104	100	97	goed
	1K140 (Jemina KWS) <sup>bcaR 9)</sup>	8	M	H	8,5	87	91	98	100	98	96	95	matig
	B1278 (BTS Smart 6745) <sup>8)</sup>	6	L	M	7	113	133	99	99	96	95	93	
Gemiddelde van de rhizoctonia rassen				M		106	114	98	99	100	98	96	

Hoge cijfers betekenen in het algemeen een gunstige waardering van de betrokken eigenschap, behalve voor K+Na en aminoN.

<sup>bcaR</sup> Tevens partiële resistentie tegen bietencysteaaltjes. Voor cijfers van deze rassen op proefvelden met bietencysteaaltjes, zie tabel 2.

<sup>1)</sup> Rubricering in de Rassenlijst: A = algemeen aanbevolen ras; N = nieuw aanbevolen ras; B = beperkt aanbevolen ras.

<sup>2)</sup> De verhoudingsgetallen (100 =) zijn gebaseerd op het gemiddelde van de A- en N-rassen van rassenlijst 2022.

<sup>3)</sup> Kophoogte: L = laag, M = gemiddeld en H = hoog boven de grond.

<sup>4)</sup> Meegeleverde grond: L = weinig, M = gemiddeld en H = veel.

<sup>5)</sup> Bladgezondheid cercospora: 4 = laag t/m 9 = hoog.

<sup>6)</sup> Voor de berekening van de financiële opbrengst zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: wortelopbrengst 85 ton/ha; suikergehalte 17%; aminoN 10 mmol/kg biet; K+Na 40 mmol/kg biet en meegeleverde grond 10%.

<sup>7)</sup> Aanvullende resistentie tegen de AYPR- of een andere nieuwe variant van het rhizomanievirus.

<sup>8)</sup> Tevens Conviso One resistentie.

<sup>9)</sup> Tevens resistentie tegen *Meloidogyne chitwoodi*.

Bron: persbericht CSAR, Aanbevelende Rassenlijst 2023, 29 november 2022.

Het onderzoek is uitgevoerd door het IRS te Dinteloord.