Teeltvoorbereiding

Begin met een schoon perceel

Bij aanwezigheid van grotere onkruiden of de opslag van groenbemesters is een bespuiting voor zaaibedbereiding met een middel op basis van glyfosaat aan te raden. Het beste tijdstip van spuiten is een aantal dagen voor de geplande zaaibedbereiding.

Als er na het zaaien van de bieten nog onkruiden bovenstaan, kan een bespuiting met glyfosaat verstandig zijn. Doe dit altijd ruim voordat de bieten doorbreken. De bestrijding is vaak minder effectief door (gedeeltelijke) grondbedekking.
Als het nog te vroeg is om te zaaien, maar het land is zonder bodemverdichting begaanbaar, is de aanleg van een vals zaaibed een optie.

Inzet van bodemherbiciden kan nuttig zijn

Er zijn een paar belangrijke redenen om een bodemherbicide kort na het zaaien toe te passen.
Bodemherbiciden bestrijden een aantal 'probleemonkruiden' beter en het kan de na-opkomstbestrijding wat makkelijker maken.
Spuit voor een goede werking op een vochtige grond. Op grond met een organische stofgehalte hoger dan 5% werken bodemherbiciden vaak matig. Bij laat zaaien neemt de noodzaak van een bodemherbicide voor opkomst af.

Opslag van bladrammenas

Bingelkruid

Probleemonkruiden kort na zaai aanpakken

Wordt veel bingelkruid en/of hondspeterselie verwacht, dan is het advies per hectare 0,05-0,10 liter Centium 360 CS of 3 liter Goltix Queen te gebruiken. Centium 360 CS kan vooral onder vochtige omstandigheden enige witverkleuring aan de bieten veroorzaken. Centium 360 CS heeft ook een goede werking op varkensgras en zwaluwtong, maar werkt niet op kamille. In de geadviseerde doseringen is het gebruik van het middel aanzienlijk goedkoper dan Goltix Queen.

Als veel kamille wordt verwacht, kan een vooropkomstbespuiting worden toegepast met 2 liter metamitron (Goltix SC/Bettix SC) per hectare. Echter, bij een tijdige toepassing na opkomst van het lagedoseringsysteem met daarin metamitron is kamille ook in het kiembladstadium goed te bestrijden.
Wordt kamille en bingelkruid en/of hondspeterselie verwacht, spuit dan voor opkomst de combinatie 0,05-0,1 liter Centium 360 CS + 2 liter metamitron of enkel 3 liter Goltix Queen per hectare.

Specifiek advies voor Conviso Smart-systeem

Bij dit systeem wordt ook geadviseerd om in het voorjaar bij ontwikkeld onkruid het perceel met glyfosaat te behandelen om een schone start te hebben. Toepassing van een bodemherbicide na zaai van de bieten is bij dit systeem niet nodig.

Sjef van der Heijden
specialist onkruidbeheersing

Hondspeterselie